зировке (1 г/кг) повышает сохранность поросят на 14,7%, нормализует обмен веществ. В результате заболеваемость снижается в 1,5–2 раза, а прирост массы тела увеличивается на 8,5%.

Применение пробиотиков экономически эффективно и оправдано, так как при снижении заболеваемости снижаются затраты на лечение молодняка, увеличиваются привесы, повышается сохранность и как следствие увеличивается валовой выход продукции (мяса и племенного молодняка).

Следовательно, применение пробиотического препарата «Бифилак» оправдано и эффективно как с зооветеринарной, так и с экономической точки зрения.

#### SUMMARY

In clause results of application of a new probiotic «Bifilac» for treatment and preventive maintenance of frustration of digestion at pigs are reflected. «Bifilac» - a polycomponental preparation possessing expressed stimulating immunity action. The preparation is applied with the preventive and medical purpose at gastroenteric frustration, improves development of animals, raises additional weights.

# Литература

- Евдокимов И.А. Симбиотические молочные продукты // Молочная промышленность. №4. 2004.
- Шальгина А.М., Эрвольдер Н.Ю., Ганина В.И. Биологическая ценность и антагонистическая активность функционального кисломолочного продукта // Молочная промышленность. №11. 2000.
- Антипов В.А. Использование пробиотиков в животноводстве // Ветеринария. 1991. №1.
- Сидоров М.А., Субботин В.В. Основы профилактики желудочно–кишечных заболеваний новорожденных животных // Ветеринария. №1. 1998. С. 3–6.
- Башкиров О.Г. Пробиотик «БиоПлюс 2Б» многогранная защита организма животного и разностороннее решение проблем в животноводстве/ БИО. октябрь 2001.

УДК 619: 547.584.636.4

А.В. Басанкин, В.А. Антипов

(Краснодарский научно-исследовательский ветеринарный институт)

# ПРИМЕНЕНИЕ ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ СУПОРОСНЫМ СВИНОМАТКАМ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА

В современных условиях ведения животноводства важное значение приобретает разработка принципиально новых эффективных профилактических мероприятий, направленных на повышение резистентности организма и продуктивности сельскохозяйственных животных путем использования экологически безопасных препаратов, естественных метаболитов, активно влияющих на энергетический обмен веществ в организме (Бузлама В.С., 1988; Кондрашова М.Н. с соавт., 1997; Березина О.В., 2000; Иванов А.В., 2000).

Учитывая положительные результаты предыдущих экспериментов по испытанию янтарной кислоты, полученной из малеинового ангидрида, на белых крысах, нами были поставлены опыты на супоросных свиноматках. В задачу исследования входило определение эффективности применения препарата свиноматкам для стимуляции роста потомства. Предусматривалось выяснение влияния янтарной кислоты на эмбриональное развитие плода и жизнеспособность потомства в постнатальный

период, для чего и были проведены ее испытания на супоросных свиноматках в условиях промышленных технологий.

Для эксперимента было сформировано три аналогичных группы свиноматок по 50 голов в каждой, на 85-90 днях супоросности, которые размещались в корпусе фермы.

Первая группа была контрольной и получала только основной рацион. Вторая была опытной и получала с кормом в виде добавки янтарную кислоту в дозе 0,1 г/кг массы тела. Третья группа также была опытная и получала янтарную кислоту в дозе 0,2 г/кг массы тела. Янтарную кислоту вводили в корм в течение 60 дней через день. Препарат растворяли в теплой воде и смешивали с утренней порцией корма.

Взвешивание животных производили в начале эксперимента и в конце, т.е. через 60 пней.

Установлено, что на приросты свиноматок оптимально влияет добавка янтарной кислоты в дозе 0,1 г/кг массы тела. Добавка янтарной кислоты в дозе 0,2 г/кг массы тела не дала больших приростов. В

Опытные группы Продуктивность Контроль маток 10,25±1,21 Кол-во поросят при рождении 9,70±1,32 10,55±0,81 Из них жизнеспособных 8,20±1,15  $9,74\pm0,86$  $10,12\pm1,12$ слабых 1,38 0.8 1,00 0,72 0,23 0,26 мертвых  $11,30\pm1,05$ 12,96±1,10 12,53±1,38 Масса гнезда при рождении, кг

1,09

1,27

Влияние янтарной кислоты на развитие плода.

среднем масса свиноматки в конце опыта в контрольной группе был 165 кг, во второй группе – 185 кг, а в третьей группе – 178 кг.

Крупноплодность, кг

Из данных таблицы следует, что количество поросят при рождении составило в группе 2-10.55 голов, в группе 3-10.25 голов, что на 8,76% и на 5,76% соответственно больше, чем в контрольной группе (9,7 гол).

В пометах свиноматок контрольной группы в среднем было 2,1 поросенка мертворожденных и слабых. Тогда как у маток, получавших янтарную кислоту, этот показатель не превышал 1,03 и 1,26 поросенка в первой и второй группах соответственно.

Самая большая масса гнезда при рождении была в группе, которая получала янтарную кислоту в дозе 0,1 г/кг массы тела – 12,96 кг, затем в группе 3, при дозе препарата 0,2 г/кг массы тела – 12,53 кг. Самая низкая масса гнезда была в контрольной группе – 11,30 кг.

Живая масса новорожденного поросенка в пометах обеих опытных групп была одинакова – 1,27 кг, что на 0,18 кг больше, чем в контрольной группе.

Таким образом, можно сделать вывод, что янтарная кислота положительно влияет на организм супоросных свиноматок, снижает эмбриональную смертность, способствует повышению крупноплодности и жизнеспособности получаемого от них потомства

1,27

По ходу эксперимента один раз в месяц проводились морфологические исследования крови, которую брали из ушной вены.

К концу эксперимента изменения эритроцитов в сторону возрастания у животных опытных групп составили соответственно 4,1% и 3,1% по отношению к контрольной группе. На уровень гемоглобина янтарная кислота оказывает положительное воздействие в крови супоросных свиноматок. За время всего эксперимента уровень гемоглобина в группе № 2 был выше на 9,9% по сравнению с контролем, а в группе № 3 на 8,9%. За весь период эксперимента количество лейкоцитов в контрольной группе выросло на 3,07%, в первой опытной группе на 55,8%, во второй опытной группе на 39,5%. Оптимальной дозой янтарной кислоты в данном эксперименте является доза 0,1 г/кг массы тела.

Таким образом, можно сделать заключение, что янтарная кислота не оказывает отрицательного влияния на клинико-физиологические параметры организма супоросных свиноматок, повышает общие и среднесуточные приросты.

## РЕЗЮМЕ

Янтарная кислота положительно влияет на организм супоросных свиноматок, снижает эмбриональную смертность, способствует повышению крупноплодности и жизнеспособности поросят, не оказывает отрицательного влияния на клинико-физиологические параметры организма супоросных свиноматок, повышает общие и среднесуточные приросты.

### SUMMARY

Succinic has positive influence on pregnant sows, lows embrio mortality, promotes pigs tobe large- foetus and vitable, it doesn't show negative influence on organism parameters, gives common and average daily increase.

# Литература

- Бузлама В.С. Адаптогены средства повышения устойчивости животных к болезням. //Селекция сельскохозяйственных животных на устойчивость к болезням и повышение резистентности в условиях промышленной технологии. Материалы Всесоюзного совещания. М., 1988, с. 9-10.
- Березина О.В. Сравнительная эффективность препаратов при железодефицитной анемии норок. //Дисс. канд. вет. наук, Казань, 2000.
- 3. Кондрашова М.Н., Ананенко А.А., Федюшкина
- Н.А., Видута О.Д., Клейменова Н.В., Пасынков И.В. Эмбриопротекторное действие янтарной кислоты на потомство животных с гипоксией и герпетической инфекцией. //Сб. Янтарная кислота в медицине, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, Пущино, 1997, с. 120-128.
- Иванов А.В. Фармако-токсикологические свойства и эффективность применения препарата «Янтарос плюс» и природных минералов в животноводстве. //Дисс. докт. биол. наук, Казань, 2000.