УДК 636.32/38.082.12

Ольховская Л.В., Силкина С.Ф., Марутянц Н.Г., Шумаенко С.Н., Скокова А.В.
(ГНУ Ставропольский НИИ животноводства и кормопроизводства
Россельхозакадемии)

ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ВЫСОКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ОВЕЦ ПО ГЕНЕТИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ КРОВИ

Ключевые слова: генетическое типирование, полиморфные системы, антигенный спектр, овцы ставропольской породы, австралийский меринос

Введение

Особую актуальность, в связи с задачами, обозначенными в программе по обеспечению продовольственной безопасности страны в области животноводства, приобретает разработка и внедрение в практическую селекцию объективных методов диагностики и прогнозирования продуктивности, племенной ценности животных в раннем возрасте, к числу которых относятся методы иммуногенетического анализа и ДНК-технологий [2].

Цель исследований.

Целью исследований явилось изучение наследуемости аллелей, сопряженных с продуктивностью, у потомства тонкорунных овец ставропольской породы СПК племзавода «Путь Ленина» Туркменского района Ставропольского края.

Методика исследований.

Генетическое типирование по группам крови проводилось по 14 антигенным факторам: Aa, Ab, Bb, Bd, Be, Bg, Bi, Ca, Cb, Ma, Mb, R, O, Da 6 систем групп крови (A, B, C, M, R, D) с помощью постановки гемолити-

ческих тестов (реакция гемолиза и агглютинации) с использованием иммунодиагностикумов банка СНИИЖК и 4 полиморфным системам белков и ферментов крови (трансферрин- Tf, гемоглобин- Hb, сывороточная арилэстераза - AEs, щелочная фосфатаза- Ap) методом горизонтального электрофореза в крахмальном геле согласно методических рекомендаций СНИИЖК [1].

Результаты исследований.

Имуногенетическое тестирование по группам крови и полиморфным системам молодняка, родившегося в 2009 году (ярочки, п=225) у маток ставропольской породы, осемененных баранами этой же породы (№6120) и австралийским мериносом (№06011) выявило специфичность аллофонда каждой половозрастной группы. При этом кровегрупповой профиль баранов австралийской селекции представлен присутствием маркеров как высокой живой массы, так и настрига шерсти.

Так, у барана № 6120 выявлен антиген Vd и локус трансферрина AD, маркиру-

Таблица 1 – Кровегрупповой состав баранов - производителей

Инд. № производителя, порода	Кровегрупповые факторы
6120 СТ	Vd, Bi, Tf AD, Hb BB, AEs HB, Ap BB
06011 АММ	Bi, Bg, Mb, Tf AD, Hb BB, AEs HB, Ap BC
0905 АММ	Bb, Bg, Cb, Ma, Tf AD, Hb BB, AEs HB, Ap BC
7135 СТ	Ab, Vd, Bi, Ma, Mb, Tf BD, Hb BB, AEs HB, Ap BC

*Примечание – генетические маркеры, сопряженные: с высокой живой массой - антигены Vd, Mb и фенотипы полиморфных систем - Tf AD, Hb BB; с настригом шерсти - антигены Ab, Be, Bg, Da, Ma и фенотипы полиморфных систем - Ap BC, AEs HB.

ющие высокую живую массу; у барана № 06011 - Mb - антиген, фенотип трансферрина AD, маркирующие живую массу и антиген Vg, фенотипы сывороточной арилэстеразы HB, щелочной фосфатазы BC – шерстную продуктивность; у барана № 0905 - фенотипы AD локуса трансферрина и BB – гемоглобина – маркирующие высокую живую массу, антигены Vg, Ma, фенотип HB сывороточной арилэстеразы, BC – щелочной фосфатазы - шерстную продуктивность; у барана СТ №7135 выявлены маркеры шерстной продуктивности - антигенные факторы Ab, Ma и фенотипы HB сывороточной арилэстеразы, BC – щелочной фосфатазы (табл. 1).

Экспертизой достоверности происхождения установлено отцовство ягнят (F1) путем сопоставления в их крови антигенных факторов и аллелей полиморфных си-

стем. При обнаружении ошибок в записях о родословной, на основании анализа генотипов отцов и матерей устанавливались истинные родители и осуществлялась корректировка родословных. В эксперименте участвовали животные с истинным происхождением, подтвержденным генетической экспертизой (n=225).

Маркерные аллели высокой продуктивности (живая масса, настриг шерсти) наследовали 34,0-51,6% потомков ставропольского барана и 48,8-50,4% - австралийского меринуса.

Присутствие генетических маркеров выразилось в большей величине живой массы, среднесуточных приростов в 4-х месячном возрасте: у потомков ставропольского барана - на 3,7 и 3,6%, австралийского меринуса – на 3,5 и 4,2% (табл. 2).

Анализ результатов продуктивности

Таблица 2 - Живая масса, среднесуточные приросты потомков носителей генетических маркеров (ярочки)

Производитель, порода	Генетические маркеры	Живая масса в 4 месячном возрасте, кг	Среднесуточные приросты от 0 до 4 мес. возраста, г.
СТ №6120	присутствие	31,10±0,407	227
	отсутствие	29,99±0,491	219
	разница, %	3,7	3,6
АММ №06011	присутствие	30,55±0,527	223
	отсутствие	29,51±0,314	214
	разница, %	3,5	4,2

Таблица 3 - Показатели продуктивности потомства разных баранов

Инд № барана	Генетические маркеры	Живая масса в 15 мес., кг	Среднесуточные приросты от 0 до 15 мес., г	Настриг чистой шерсти, кг
СТ №6120	присутствие	49,5±1,110	102,6	3,2
	отсутствие	45,7±0,568	94,3	2,7
	разница, %	8,3	8,8	18,5
АММ №06011	присутствие	51,9±0,918	107,0	3,2
	отсутствие	46,8±0,542	96,0	3,0
	разница, %	10,9	11,4	6,6

потомков баранов ставропольской породы и австралийского меринуса (F1) в 15-ти месячном возрасте подтвердил выявленную закономерность (табл.3).

Заключение.

Вышеизложенное позволяет заключить, что животные - носители генетических маркеров являются наиболее оптимальным исходным материалом для после-

дующей реализации отбора, подбора при создании новых линий, типов животных. Широкое вовлечение в селекционный процесс животных - носителей аллелей и их ассоциаций, сопряженных с высокой продуктивностью будет способствовать концентрации в селекционных группах, стадах генетических структур, маркирующих желательные признаки.

Резюме: В статье приведены результаты наследования ярками генетических маркеров шерстной и мясной продуктивности баранов отечественной и импортной селекции.

SUMMARY

In the article are given the inheritance results of wool and meat productivity genetic markers by domestic and imported vams breeding in ewe lambs.

Keywords: genetic typing, polymorphic systems, antigenic spectrum, sheep of Stavropol breed, Australian Merino.

Литература

Методические рекомендации по применению генетических тестов в селекции овец и коз / Чижова Л.Н., Селионова М.И., Абонеев В.В. и др. – Ставрополь, 2005. 46 с.

2. Чижова Л.Н., Абонеев Д.В. Генетические маркеры в животноводстве / Междунар. конференция, посвященная дню науки. Чехословакия, Прага, 2012. С. 58-60.

Контактная информация об авторах для переписки

Ольховская Людмила Викторовна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории иммуногенетики, биохимии и общей химии ГНУ СНИИЖК Россельхозакадемии,

Силкина Светлана Фёдоровна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории иммуногенетики, биохимии и общей химии ГНУ СНИИЖК Россельхозакадемии, тел 8 (8652) 71-72-18, сот 8-961-447-04-42, E-mail: immunogenetika@yandex.ru

Марутяц Надежда Георгиевна, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории иммуногенетики, биохимии и общей химии ГНУ СНИИЖК Россельхозакадемии,

Шумаенко Светлана Николаевна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории овцеводства ГНУ СНИИЖК Россельхозакадемии,

Скокова Антонина Владимировна, старший научный сотрудник лаборатории иммуногенетики, биохимии и общей химии ГНУ СНИИЖК Россельхозакадемии.