Контактная информации об авторах для переписки

Громов И.Н., кандидат ветеринарных наук, доцент

**Селиханова М.К.,** аспирант, УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины», Республика Беларусь

Алиев А.С., доктор ветеринарных наук, профессор

**Бурлаков М.В.**, аспирант, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины», Российская Федерация

**Таймасуков А.А.**, кандидат ветеринарных наук, Генеральный директор ОАО «Компания Кубаныптицепром»

УДК 619:639.3

Дубинин А.В., Шинкаренко А.Н.

(Волгоградский ГАУ)

# БАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБСЕМЕНЕННОСТЬ ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ ПРИ ДИПЛОСТОМОЗЕ И ПОСТОДИПЛОСТОМОЗЕ

Ключевые слова: Болезни рыб, диплостомоз, постодиплостомоз, бактериологическая обсемененность промысловых рыб.

Введение.

Постодиплостомоз и диплостомоз довольно широко распространенные заболевания среди рыб разных видов, как в естественных водоемах, так и в нерестово-выростных хозяйствах Волгоградской области [1,3].

Микробная обсемененность рыбы находится в прямой зависимости от количества и качества микрофлоры водоема, а так же таких факторов как паразитарные болезни. Из литературных данных следует, что рыба обсеменена преимущественно мезофильными микроорганизмами, которые и составляют группу условнопатогенных и патогенных бактерий. Причем известно, что в воду могут попасть кишечные палочки, энтерококки, сальмонеллы, шигеллы, клостридии [2].

Так как мясо рыбы по химическому составу близко к мясу млекопитающих, то при высоком уровне бактериальной обсемененности рыбы мезофильной микрофлорой, уменьшаются сроки хранения свежей и замороженной рыбы, а так же при употреблении таких рыбных продуктов в пищу возможно возникновение токсико-инфекций.

Цимлянское водохранилище является одним из крупнейших водохранилищ Волгоградской области, где ведется рыбный промысел. В связи с этим наиболее актуальным вопросом является изучение бактериальной обсемененности рыбы в условиях данного водохранилища.

Материалы и методы исследований.

Исследования рыбы проводили в условиях Цимлянского водохранилища Волгоградской области, за период 2009-2011 года. Причем исследованию подвергнуто 5860 экземпляров рыб разных видов, которые имеют основное промысловое значение для Волгоградской области - лещ, густера, судак, берш, плотва, карась, синец, сазан, толстолобик.

Диагностику диплостомоза и постодиплостомоза проводили с использованием метода полного гельминтологического вскрытия рыб по методу В.А. Догеля (1970).

Отбор проб для бактериологического исследования проводили по общепринятой методике с последующими посевами материала (образцы кожи и жабр) на общеупотребительные и специальные питательные среды. Для установления систематической принадлежности микроорганизмов были использованы определители (Краткий определитель Берги, 1980; Определитель бактерий Берджи, 1997).

Результаты исследований.

По результатам наших исследований

Таблица 1

следует, что менее всего контаминирована микрофлорой кожа рыб 260±70 КОЕ/ мл, в то время как на жабрах, нами отмечена максимально высокая бактериальная численность микроорганизмов - 2533±84 КОЕ/мл.

Так же мы установили, что качественный состав микрофлоры промысловых рыб в условиях Цимлянского водо-

хранилища представлен 7 семействами (Pseudomonadaceae, Enterobacteriaceae, Micrococcaceae, Listeriaceae, Vibrionaceae, Bacillaceae, Neisseriaceae), 4 родами (Pseudomonas, Staphylococcus, Bacillus, Listeria).

Результаты исследований представлены в таблицах №1,2.

Из приведенных данных следу-

Уровень бактериологической обсемененности промысловых рыб при диплостомозе

	Бактериологическая обсемененность промысловых рыб, КОЕ/мл									
Таксон	Лещ	Густера	Судак	Берш	Плотва	Карась	Синец	Сазан	Толсто лобик	
Сем. Enterobacteriaceae	260± 19,8	294± 35,1	-	-	280±23	274± 14,6	-	268± 24,3	-	
Сем. Neisseriaceae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сем. Vibrionaceae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сем. Saccharomycetaceae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Род Azotobacter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Род Bacillus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Род Listeria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Род Planococcus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Род Pseudomonas	864± 48,2	970± 58,3	-	-	320±23,5	418± 30,3	231± 21,1	420± 23,1	-	
Pseudomonas aeruginosa	225± 26,9	359± 35	-	-	-	69±5,8	-	126± 16,4	-	
Pseudomonas alcaligenes	-	114± 11,7	-	1	-	-	-	-	-	
Род Arthrobacter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Род Staphylococcus	386± 40,8	527±47	-	-	-	-	-	-	-	

Таблица 2 Уровень бактериологической обсемененности промысловых рыб при постодиплостомозе

	Бактериологическая обсемененность промысловых рыб, КОЕ/мл									
Таксон	Лещ	Густера	Судак	Берш	Плотва	Карас	Синец	Сазан	Толст олоб ик	
Сем.	420±	560±	280±	266±	416±	507±	294±	459±	260±	
Enterobacteriaceae	40,7	58,6	46,9	29,1	52,7	55,7	35,2	40,5	27,0	
Сем. Neisseriaceae	-	268±42	-	-	-	-	-	-	-	
Сем. Vibrionaceae	270± 40,8	296± 58,3	-	-	-	-	-	-	-	
Сем. Saccharomycetaceae	-	260± 73,7	-	-	-	-	-	-	-	
Род Azotobacter	-		-	-	-	-	-	-	-	
Род Bacillus	-	264± 86,6	-	-	-	-	-	-	-	
Род Listeria	260± 65,7	280± 87,1	-	-	-	-	-	-	-	
Род Planococcus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Род Pseudomonas	2479± 79,4	2533±84	356± 35,3	498± 36,1	1984±4 3,4	2300± 46,7	620± 35,1	2430 ±45,6	935± 41,2	
Pseudomonas aeruginosa	1200± 67,1	1633± 159	-	-	-	1185± 192,2	-	1470 ±134	-	
Pseudomonas alcaligenes	812± 67,6	900±67	-	-	-	857± 79,5	-	921± 58,4	-	
Род Arthrobacter	-		-	-	-	-	-	-	-	
Род Staphylococcus	1100± 177,3	1720± 135	214± 20,4	341±16, 4	1256±1 64,2	1021± 84,4	362±3 4	981± 58	373± 35,6	

ет, что при диплостомозе рыба контаминирована микроорганизмами Сем. Enterobacteriaceae и рода Pseudomonas.

Однако при постодиплостомозе такие виды промысолвых рыб как густера, плотва, карась, сазан и толстолобик имеют бо-

лее высокий уровень обсемененности микрофлорой Сем. Enterobacteriaceae, рода Pseudomonas (Pseudomonas aeruginosa), рода Staphylococcus, относящихся к возбудителям токсикоинфекций.

**Резюме**: В статье приведены результаты изучения бактериальной обсемененности промысловых рыб при диплостомозе и постодиплостомозе в условиях Цимлянского водохранилища Волгоградской области.

### SUMMARY

There are described the results of studying of bacterial semination of marketable fish in diplostomose and postodiplostomose under conditions of Tsimlyansky reservoir of Volgograd region.

Keywords: diseases of fishes, diplostomose, postodiplostomose, bacteriological semination of marketable fish

### Литература

- 1. Васильков, Г.В. Гельминтозы рыб / Г.В. Васильков. М.: Колос, 2003. 208 с.
- 2. Грищенко, Л.И. Болезни рыб и основы рыбоводства / Л.И. Грищенко. М.: Колос, 1999. -278 с.
- 3. Федоткина, С.Н. Паразитофауна рыб в естественных и искусственных водоемах Волгоградской области/ С.Н. Федоткина, А.Н. Шинкаренко//Изве-
- стия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса.- Волгоград, 2007.-№4.-С. 98-100.
- 4. Беретарь И.М. Паразитофауна белого толстолобика в прудовых хозяйствах Краснодарского края. Краснодар. Ветеринария Кубани, № 5, 2009. с. 10-11.

## Контактная информации об авторах для переписки

Дубинин Александр Валерьевич, аспирант, ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет», г. Волгоград, пр. Университетский, д. 24а, (8442)411619 (раб), e.mail: Dubinin134@mail.ru

Шинкаренко Александр Николаевич, доктор ветеринарных наук, заведующий кафедрой инфекционной патологии и судебной ветеринарной медицины, ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный аграрный университет», г. Волгоград, пр. Университетский, д. 24а, (8442)411619 (раб), e.mail: ash28@yandex.ru

УДК 619:616.98:578.824.91:636.22/.28:616-078

Константинова Е.А., Диев В.И.

(Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ»))

# РАЗРАБОТКА НЕПРЯМОГО ВАРИАНТА ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ АНТИТЕЛ К ВИРУСУ ЭФЕМЕРНОЙ ЛИХОРАДКИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Ключевые слова: вирус эфемерной лихорадки крупного рогатого скота, иммуноферментный анализ

### Введение

Эфемерная лихорадка (ЭЛ) (трехдневная лихорадка, эпизоотическая лихорадка) – острая вирусная трансмиссивная болезнь крупного рогатого скота (КРС), характеризуется кратковременной лихо-

радкой, воспалением слизистой оболочки глаз, носовой и ротовой полостей, а в тяжелых случаях - параличами и хромотой, снижением лактации [6, 7, 8]. Встречается в тропических и субтропических зонах, в том числе в сопредельных с Россией госу-